

BlephaCura® on liposomiyhdiste silmäluomen reunan tulehdusten lievittämiseen ja päivittäiseen hoitoon

Ainesosat

Soijalesitiini, A-vitamiini (palmitaatti), E-vitamiini, etanoli, natriumkloridi, fenoksetanoli, tislattu vesi.

Mihin tuotetta käytetään

BlephaCura®-tuotetta käytetään silmäluomen reunan tulehdusten lievittämiseen ja hoitoon sekä silmäluomen reunan päivittäiseen hoitoon ja puhdistukseen. BlephaCura® tukee tulehtuneen tai ärtyneen silmäluomen reunan alueen luonnollista paranemisprosessia ja edistää sitä.

Miten tuotetta käytetään

Kädet on suositeltavaa pestä ennen tuotteen käyttöä. BlephaCura®-tuotetta on suositeltavaa käyttää kahdesti päivässä aamuin illoin. BlephaCura® levitetään käyttämällä nukkaamatonta (puuvillaista) tynnyä, joka soveltuu silmäluomen hoitoon. Saastumisen ehkäisemiseksi pullon kärkei ei saa koskettaa mihinkään pintaan, kuten puuvillatynnyyn. Tiputa BlephaCura®-tuotetta puuvillatynnyyn siten, ettei pullon kärki kosketa tynnyä. Silmäluomen reunan päivittäisten hoito- ja puhdistustointien aikana karsta ja kerrostumat on poistettava huolella kokonaan ennen BlephaCura®-tuotteen levittämistä.

Käyttövinkejä:

- Kostuta vanutynny BlephaCura®-lla
- Kostuta sitten silmäluomi, erityisesti silmäluomen reunat ja silmäripsien tyvi kyläisellä vanutynnyllä ja hiero kevyesti silmäluomen ylä- ja alareunat.
- Pyyhi varovasti kaikki karstat pois. Käsiteltäessä silmäluomen reunoja, on suositeltavaa vetää sormella alaluonta varovasti alaspäin ja vastaavasti yläluonta varovasti ylöspäin, niin että silmäluomen reunaan pääsee helposti. Jos tarpeen, vaihda käytetty vanutynny uuteen.

Hävitä käytetty vanutynny; älä käytä toisen silmäluomen hoitamiseen samaa vanutynnyä.

Älä lisää BlephaCura®-tuotetta suoraan silmään. Älä kosketa vanutynnyllä silmäluomien sisäpintaa tai silmien pintaa.

Haittavaikutukset

Ei tunnettuja haittavaikutuksia

Älä käytä tuotetta

jos olet yliherkkä jollekin BlephaCura®-tuotteen sisältämälle aineelle.

Muuta tietoa

Silmäluomen reunan tulehdus (blefariitti) on tavallisesti krooninen sairaus, jonka hoidossa ja kulussa voi ilmetä pahenemisvaiheita ja oireiden uusiutumista, minkä vuoksi huolelliset päivittäiset hoitotoimet ovat erityisen tärkeitä.

Tarvittaessa on hyödyllistä laittaa lämmin pyyhe (37–38 °C) suljettujen silmäluomien päälle noin 15 minuuttia ennen BlephaCura®-hoitoa. Tämä pehmittää silmissä olevaa karstaa ja helpottaa niiden pois pyyhkimistä.

Liposomien fosfolipidit omaavat kipua ja tulehdusta lieventäviä ominaisuuksia, jotka helpottavat tulehdusta. Liposomit tukevat haavojen paranemista ja hoitavat ärtynttä ja tulehtunutta ihoa.

Käyttöaika ja säilytys

Säilytä viileässä ja kuivassa. Säilyy 2–25 °C asteessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Sisältö on käytettävä 4 viikon kuluessa tuotteen avaamisesta.


Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Tämä pakkauseloste on hyväksytty viimeksi: 2012-11



abigo

CE

 Optima Medical Swiss AG,
Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug

Konsumentkontakt/Markkinoija:

SE: ABIGO Medical AB
Tel + 46 31 7484950
www.abigo.se

DK: ABIGO Pharma A/S
Tel: + 45 46498676
www.abigo.dk

NO: Abigo Medical AS
Tlf: + 46 31 7484950
www.abigo.no

FI: Sabora Pharma Oy
Puh. + 358 (09) 225 7147
www.saborapharma.fi